

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 031224

Bucky-behandling

Bløde røntgenstråler

Bucky kaldes også "bløde røntgenstråler", fordi de kun trænger 0,5 mm ned i huden. Bucky anvendes ved psoriasis, kronisk eksem eller tilsvarende hudsygdomme og gives ofte som supplement til anden behandling. Behandlingen virker kløestillende og hæmmende på betændelsesreaktioner. Effekten af behandlingen indtræder oftest først efter endt behandlingsserie.

Hvor ofte skal der behandles

Bucky gives efter lægeordination 3-5 gange med 7-14 dages interval. Selve behandlingen tager ca. 9 sekunder.

Lægekonsultation

Opfølgning foregår efter endt behandlingsserie efter behov. Her vurderes det, om behandlingen har haft den ønskede effekt, og der tages stilling til fremtidig behandling.

Vær særlig opmærksom på

Behandlingen kan give en midlertidig rødme, som kan efterfølges af en længerevarende brunfarvning af det behandlede område. Bucky gives ikke ubegrænset, da der kan være risiko for udvikling af en mild form for hudkræft i det område, der er behandlet. Risikoen er dog lille og må opvejes mod den bedring af hudlidelsen, som behandlingen kan give. Der er tale om godartet hudkræft, som kan behandles tilfredsstillende, og hvor risikoen for spredning til indre organer er yderst ringe.