

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard, 121124

Curettage / tangentielt excision

Ved **curettage** skræbes det uønskede væv af.

Ved **tangentielt excision** skæres vævet af i niveau med omkringliggende hud.

Efterfølgende vil lægen ofte brænde såret i bunden for at standse blødning og fjerne eventuelle vævsrester.

Behandlingen kan med fordel bruges ved en række former for hudkræft og ved godartede hudforandringer.

Når bedøvelsen aftager, kan såret være lidt ømt. Man kan tage f.eks. paracetamol og/eller ibuprofen ved behov for smertelindring.

Vi anbefaler, at du lader plastret sidde på i 2 døgn efter operationen. Derefter bør du dagligt vaske såret forsigtigt med vand og sæbe og duppe det tørt med et rent håndklæde. Ved behov kan du dække såret med hudvenlig tape.

Hvis såret begynder at bløde under plastret, eller efter at dette er fjernet, anbefaler vi, at du trykker hårdt og konstant med en finger ind mod såret i ca. 20 minutter. Hvis plastret er gennemvædet, sættes et nyt plaster på.

Hvis såret bliver hævet, rødt rundt om, varmt eller giver tiltagende smerter, eller

du får feber, kan det være tegn på infektion. Du skal i dette tilfælde kontakte klinikken eller egen læge, som vil vurdere, om der er behov for yderligere tiltag.

Bemærk, at gult sekret eller væske ikke i sig selv er tegn på infektion.

Behandlingen efterlader et let nedsunket sår, som danner skorpe, og efter ca. 2-3 uger er såret nået op i hudniveau.

Derefter kan det tage 1-3 uger, inden overfladen er helt ophelet. På benene er det ikke usædvanligt, at sårhelingen tager ca. 8 uger. Man bør ikke pille sårskorpen af. De første måneder kan arret være ret rødt i farven, men efter 3-6 måneder bliver det mere lyst og hvidligt. Der kan i visse tilfælde opstå uskøn ardannelse eller dårlig sårheling.

Det fjernede væv indsendes til mikroskopisk undersøgelse for at stille, bekræfte eller udelukke en diagnose, og du får svaret og besked om eventuel supplerende behandling ved at ringe til lægen i telefontiden man-tors 8.15.8.45 efter **4 uger**.

Det første år efter operationen bør man dække arret med lystæt plaster ved ophold i solen for at undgå misfarvning.