

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 161224

Dapson

Dapson er et antibiotikum som dæmper betændelsesprocesser og kan anvendes til behandling af visse sjældne hudsygdomme.

Dapson gives som tabletter og tages 1-2 gange dagligt. Til børn kan dapson gives som mixtur.

Dapson virker i løbet af uger til få måneder.

De fleste tåler dapson godt. Dapson binder sig til de røde blodlegemer og kan derved hæmme iltningen af blodet. Dette kan medføre træthed, hovedpine, svimmelhed, kvalme og vejrtrækningsbesvær.

I mere sjældne tilfælde kan der forekomme leverpåvirkning, nyrefunktionspåvirkning, knoglemarvspåvirkning, synsforstyrrelser, ændret følesans, nervøsitet eller udslæt.

Hvis du er allergisk over for sulfonamider kan du ligeledes være allergisk overfor dapson. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din hudlæge, hvis du får bivirkninger.

Før behandlingen

Hvis du ikke er fra Nordeuropa, bør du undersøges for glukose-6-phosphat-dehydrogenase mangel, inden dapson behandlingen startes. Dette gøres ved hjælp af en blodprøve.

Kontrol af behandlingen

Det er vigtigt med jævnlig blodprøvekontrol. Aftal nærmere med din hudlæge.

Det er vigtigt, at du oplyser hudlægen om din øvrige medicin. Følgende medicin kan påvirke dapsonbehandlingen:

- Probenecid
- Trimetoprim
- Pyrimethamin
- Rifampicin
- Methotrexat

Graviditet og amning

Dapson bør ikke tages i forbindelse med graviditet og amning.

Vær særlig opmærksom på anden medicin

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Øernes Kaj 2, st.
DK-3700 Rønne
+45 56 95 86 00