

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 031224

Isotretinoin

Hvordan virker isotretinoin?

Isotretinoin er kemisk beslægtet med A-vitamin. Det virker ved at hæmme talgkirtlernes funktion og er særdeles effektivt til behandling af svær acne og visse andre hudsygdomme. De første uger under behandlingen kan acnen forværres. Hos de fleste indsætter virkningen efter 1-2 måneders behandling. Den samlede behandlingsperiode er sædvanligvis 4-6 måneder.

Hvordan tages isotretinoin?

Kapslerne tages én gang dagligt i forbindelse med et hovedmåltid.

Isotretinoin og anden medicin

Da isotretinoin er beslægtet med A-vitamin, må man i behandlingsperioden ikke indtage mere A-vitamin, end der er i en almindelig vitamintablet. Isotretinoin må ikke indtages sammen med lægemidler fra tetracyclingruppen.

Bivirkninger

De fleste oplever tør hud og tørre læber i behandlingsperioden. Håret kan føles mindre fedtet end sædvanligt. Slimhinder i øjne og næse kan tørre ud. Det kan medføre besvær med kontaktlinser og risiko for næseblod. For at undgå at den tørre hud fører til eksem, er det en god idé at anvende fede cremer på huden. Læbepomade og vaseline kan anvendes på læber og i næsebor. Soldyrkning bør begrænses, fordi man lettere bliver skoldet.

Det er ikke tilladt at være bloddonor i behandlingsperioden samt den første måned efter behandlingsophør.

Muskel- og ledømhed kan forekomme, specielt under sportsudøvelse.

Depression er en mulig, men sjælden bivirkning. Derfor skal man henvende sig til lægen ved uventede ændringer i humør og/eller tankeindhold.

Prævention, graviditet og amning

Isotretinoin er fosterbeskadigende. Ved behandling af kvinder er det derfor et krav at anvende sikker

prævention i behandlingsperioden samt 1 måned efter behandlingsophør. Skulle graviditet alligevel indtræffe i denne periode, er abort en nødvendighed.

Isotretinoin må ikke indtages under amning.

Sikkerhed og kontrol

Fedtmængden i blodet kan stige, og leveren kan påvirkes af isotretinoin. Dette kontrolleres med blodprøver. Før behandlingen påbegyndes, tages blodprøver. Hos kvinder endvidere graviditetsundersøgelse ved urinprøve eller blodprøve. Når der foreligger normale prøvesvar, kan behandlingen påbegyndes.

Efter en måneds behandling gentages prøverne. Hvis disse fortsat er normale, er yderligere kontrolprøver ikke nødvendige hos mænd. Hos kvinder skal graviditetstesten gentages 1 gang om måneden i hele behandlingsforløbet.

Receptfornyelse

Til kvinder udskrives en ny recept ved de månedlige kontroller. Recepten skal indløses indenfor 7 dage efter udstedelsen og giver adgang til 30 dages behandling. Graviditetstest og receptbegrænsningen sikrer, at kvindelige patienter ikke indtager medikamentet under graviditet. Udlandsrejse eller andre praktiske forhold kan vanskeliggøre denne rutine. Behandlingen vil i givet fald kunne fortsættes på eget ansvar. Apoteket skal følge lægens receptordination og kan således ikke nægte at udlevere medicinen på trods af den principielle månedsregel.