

Malignt melanom

modermærkekræft


Modermærkekræft opstår oftest i pigmentceller i huden, men kan også opstå i øjets pigmentceller eller andre steder i kroppen, men det er meget sjældent. Denne tekst omhandler kun modermærkekræft i huden

Modermærkekræft kan opstå i et bestående modermærke, men det opstår oftere som en helt ny svulst i normal hud.

Typiske symptomer er:

- Nyt modermærke - det er især sjældent at få nye modermærker efter 40-årsalderen
- Ændring af størrelse, farve eller form af eksisterende modermærke
- Ubehag, svie, smerter og kløe i et eksisterende modermærke
- Blødning eller sår dannelse i et modermærke, uden at det har været udsat for noget der kan give sår eller blødning, f.eks. et slag eller en rift
- Kløe er det mindst specifikke symptom, og opstår ofte i almindelige fredelige modermærker

Når der er rejst mistanke om modermærkekræft, vil mærket blive fjernet i lokalbedøvelse og sendt til mikroskopisk undersøgelse. Hvis mistanken bekræftes, vil der blive foretaget yderligere operation, hvor en



større del af huden rundt om mærket fjernes. Der kan også være behov for undersøgelse af en eller flere lymfeknuder.

Det videre forløb afhænger af svulstens tykkelse. Det kan i visse tilfælde komme på tale at give kemoterapeutisk behandling og/eller immunterapi.

Der vil altid blive lagt et individuelt opfølgningsprogram efter modermærkekræft.

Når man får stillet diagnosen modermærkekræft, vil der naturligt opstå mange spørgsmål. Du er meget velkommen til at stille disse ved konsultation med hudlægen.