

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 260625

Actikerall til vorter

5-fluoruracil og salicylsyre

Actikerall er en opløsning indeholdende et hudopløsende og et celledræbende stof.

Actikerall kan bruges til at behandle vorter, hvor andre behandlinger har vist sig ineffektive eller ikke tåles.

Der er tale om såkaldt off-label behandling, da Actikerall normalt anvendes til behandling af solskader. Der er lang erfaring for, at Actikerall er sikkert og effektivt til at behandle vorter, også hos børn.

Behandlingen kan efter instruktion foretages som hjemmebehandling.

Behandlingen udføres én gang dagligt, indtil vorterne er væk, dog maksimalt 16 uger.

Sådan udføres behandlingen

1. Ryst flasken
2. Skru låget med indbygget pensel af flasken
3. Lad penslen dryppe overskydende væske af på indersiden af flaskens kant (som ved neglelak)
4. Pensl væsken på vorten og ca. 3 mm af den omgivende normale hud
5. Lad væsken tørre ind. Der vil dannes en hvidlig hinde over området.
6. Skru låget på flasken

Det behandlede område skal ikke dækkes med plaster eller anden forbinding.

Sådan fjernes den foregående dags behandling

1. Fjern den hvide hinde ved at trække i kanten med en pincet eller andet lignende redskab
2. Fjern resten ved at trække i det løse område med to fingre

Behandlingen kan have bivirkninger, som oftest er milde og forbigående. Der kan f.eks. ses rødme, betændelse, kløe, blødning, skæl- og skorpedannelse. Behandlingen kan fortsættes trods disse bivirkninger.

Actikerall må ikke bruges under graviditet og amning.

Actikerall må ikke bruges, hvis du er i behandling med epilepsimedicin indeholdende phenytoin eller fosphenytoin, f.eks. Pro-Epanautin.

Actikerall er brandfarligt og må ikke bruges i nærheden af åben ild.

Actikerall kan misfarve tekstiler.