

Seborroiske keratoser

Konevorter/gammelmandsvorter/skælvorter/
Visdomsvorter/seniorknopper

Seborroiske keratoser er almindeligt forekommende hudforandringer, som skyldes godartet vækst af de overfladiske hudceller. De er helt ufarlige og udvikler sig ikke til hudkræft. De smitter ikke.

Årsagen er ukendt, men man regner med, at både genetik og solpåvirkning spiller en rolle.

Som regel giver keratoserne ingen symptomer, men de kan klø og blive røde og inflammerede.

Seborroiske keratoser har en ru og fedtet overflade og kan variere i farve fra helt lyserød til sort. De kan ses i alle aldersgrupper, men bliver tiltagende hyppige med alderen. Hos personer med mørk hudtype kan der ses mange mindre seborroiske keratoser i ansigtet og på halsen.

Små flade seborroiske keratoser kan blive større og mere fortykkede, som årene går. Størrelsen kan variere fra få millimeter til flere centimeter. De kan give indtryk af at være "klistret uden på huden".

Diagnosen kan ofte stilles på udseendet alene. I tvivlsfælde kan der tages hudbiopsi.

Der er ingen medicinsk grund til at behandle keratoserne, men mange er generede af udseendet eller placeringen af keratoserne.



De kan behandles med frysning, hvorved de ofte løsner sig, og man kan pille både skorpe og keratose af efter ca. 10 dage, hvor der er dannet ny hud nedenunder. Ved større elementer kan det være nødvendigt at skrabe dem af i lokalbedøvelse.