

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 090226

Colchicin

Colchicin er et lægemiddel, som dæmper inflammation i kroppen. Det har været anvendt i mange år, især til behandling af urinsyregigt, men bruges også inden for **dermatologi** til visse inflammatoriske og auto-inflammatoriske hudsygdomme.

Inden for dermatologi kan colchicin anvendes til:

- **Behçets sygdom** (især slimhinde- og hudsymptomer)
- **Neutrofile dermatoser** (fx Sweet's syndrom)
- **Vaskulit**
- **Erythema nodosum**
- **Aftøs stomatitis**
- Andre sjældne inflammatoriske hudsygdomme

Colchicin virker ved at hæmme betændelsesreaktioner, især dem der involverer bestemte hvide blodlegemer (neutrofile granulocytter).

Effekten af colchicin kan komme relativt hurtigt, ofte inden for **dage til få uger**, men ved nogle tilstande kan der gå længere tid, før fuld effekt ses.

Behandlingen er ofte langvarig og kræver regelmæssig opfølgning.

- Colchicin tages som tabletter, oftest **1–2 gange dagligt**,

afhængigt af din sygdom og lægens vurdering

- Tabletterne kan tages med eller uden mad, men **indtag sammen med mad** kan mindske mavegener
- Følg altid den ordinerede dosis nøje

Det er vigtigt **ikke at overskride den ordinerede dosis**, da colchicin i for høje doser kan være skadeligt.

Colchicin kan give bivirkninger, især fra mave-tarmkanalen.

Almindelige bivirkninger

- Diarré
- Kvalme og opkastning
- Mavekneb

Disse symptomer er ofte dosisafhængige og kan aftage ved dosisreduktion.

Sjældne, men alvorlige bivirkninger

- Påvirkning af knoglemarven (nedsat produktion af blodceller)
- Muskelsvaghed eller muskelsmerter
- Nervepåvirkning
- Lever- eller nyrepåvirkning

Kontakt læge straks ved:

- Vedvarende eller svær diarré
- Uforklarlig træthed, blå mærker eller infektioner
- Muskelsmerter eller udtalt svaghed

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 090226

Ved længerevarende behandling vil der typisk være behov for:

- **Regelmæssige blodprøver** (blodtal, lever- og nyrefunktion)
- Vurdering af eventuelle bivirkninger

Colchicin kan interagere med andre lægemidler, herunder visse:

- Antibiotika
- Svampemidler
- Kolesterolssænkende medicin (statiner)

Oplys altid din læge om **al anden medicin**, kosttilskud eller naturlægemidler, du tager.