

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 070226

Daxas

Roflumilast

Daxas er et lægemiddel, der oprindeligt er udviklet til at behandle KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Vi har klinisk erfaring med, at lægemidlet også virker til behandling af hudsygdomme, hvor immunforsvaret er overaktivt, fx psoriasis og hidrosadenitis suppurativa. Dette er såkaldt "off-label behandling", da lægemidlet, i Danmark, kun er indregistreret til behandling af KOL. Det aktive stof i Daxas hedder roflumilast.

Daxas er en tabletbehandling, der som udgangspunkt tages én gang dagligt. Daxas kan tages med eller uden mad, men det er hensigtsmæssigt, hvis det er cirka samme tidspunkt på døgnet hver dag. Der findes tabletter på 250 mikrogram og 500 mikrogram. Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis du skal tage.

Varigheden af behandlingen afhænger af din sygdom. Du kan forvente effekt af behandlingen efter nogle uger, og den fulde effekt ses efter 3-6 måneder.

Før behandlingen skal du have taget blodprøver. I det første år af behandlingen skal du have taget blodprøver cirka hver 3. måned.

Det meste medicin er sikkert at tage samtidigt med Daxas. Der er dog visse lægemidler som kan interagere. Hvis du under behandlingen med Daxas skal opstarte anden medicin, skal du derfor fortælle din læge, at du også får Daxas.

Som alle andre lægemidler kan Daxas give bivirkninger. De ses almindeligvis i starten af behandlingen og aftager efter de første uger.

Hyppige bivirkninger

- nedsat appetit
- vægttab
- mavesmerter
- diarré
- kvalme
- opkastning
- hovedpine
- søvnbesvær.

Sjældne bivirkninger

- muskelsvaghed
- angst
- svimmelhed
- rysten
- hypersensitivitet.

Meget sjældent er beskrevet øvre luftvejsinfektioner, frisk blødning fra endetarmen, brystudvikling hos mænd, depression, nervøsitet og allergiske reaktioner.

Hvis du er undervægtig, anbefales der regelmæssig vægtkontrol, da vægttab er set i forbindelse med behandlingen. Endvidere skal du være opmærksom på psykiske symptomer under behandlingen, da dette i sjældne tilfælde har været rapporteret. Hvis du tidligere har haft depression eller været selvmordstruet, frarådes opstart af Daxas.

Alle patienter i behandling med Daxas anbefales årlig influenzavaccination samt vaccination mod coronavirus. Du må ikke blive vaccineret med levende vacciner.

Du må ikke få Daxas, hvis du er gravid eller ammer. Der er ikke påvist nogen risiko ved graviditet, hvis manden er i behandling med Daxas.