

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 070226

Donovanose

Donovanose, også kaldet **granuloma inguinale**, er en **sjælden seksuelt overført infektion (SOI)** forårsaget af bakterien *Klebsiella granulomatis*. Infektionen giver langsomt udviklende sår på kønsorganerne og i området omkring endetarmen.

Donovanose forekommer sjældent i Danmark, men ses hyppigere i visse områder af verden, herunder dele af Afrika, Asien, Sydamerika og Australien.

Donovanose smitter primært ved **seksuel kontakt**, herunder:

- Vaginalt samleje
- Analt samleje

Smitte sker ved direkte kontakt med sår eller slimhinder. Smitte via oralsex er sjælden. Inkubationstiden (tiden fra smitte til symptomer) er ofte **uger til måneder**.

Symptomerne udvikler sig ofte langsomt.

Typiske symptomer

- Små knuder eller sår på kønsorganer, i lysken eller omkring endetarmen
- Sårene er ofte:
 - **Smertefri**
 - Røde og fugtige
 - Let blødende ved berøring

Andre symptomer

- Gradvis forstørrelse af sårene
- Arvævsdannelse ved langvarig sygdom

Ubehandlet kan donovanose føre til **udtalte vævsskader og deformering** i det ramte område.



Diagnosen stilles ved:

- Klinisk undersøgelse
- **Podning eller vævsprøve (biopsi)** fra såret
- Påvisning af bakterien ved mikroskopi eller laboratorieundersøgelse

Det kan være nødvendigt at udelukke andre årsager til kønssår, fx syfilis, herpes eller ulcus molle.

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 070226

Donovanose behandles med **antibiotika**, ofte over en længere periode, typisk:

- **Azithromycin**
eller
- Doxycyklin eller andet antibiotikum

Behandlingen fortsættes indtil sårene er helt helet, hvilket ofte tager **flere uger**.

Det er vigtigt at:

- Tage medicinen som ordineret
- Møde op til kontrol
- Undgå sex, indtil behandlingen er afsluttet, og sårene er helet

Ved korrekt behandling kan donovanose helbredes fuldstændigt.

Partnere og smitteopsporing

Seksualpartnere bør:

- Informeres
- Tilbydes undersøgelse og evt. behandling

Du kan mindske risikoen for donovanose og andre STI ved at:

- Bruge kondom
- Undgå sex ved sår på kønsorganerne
- Blive testet ved symptomer eller efter risikokontakt