

Gonorré

Dryppert

- Halsbetændelseslignende symptomer

Gonorré er en seksuelt overført infektion (SOI), som skyldes bakterien *Neisseria gonorrhoeae*. Den smitter primært ved seksuel kontakt – vaginalt, analt eller oralt – men kan også i sjældne tilfælde overføres fra mor til barn under fødslen.

Gonorré er en af de mest almindelige kønssygdomme i Danmark, og antallet af tilfælde har været stigende de seneste år.



Symptomerne viser sig normalt inden for få dage efter smitte, men nogle personer – især kvinder – kan være smittet uden at mærke symptomer.

Hos mænd:

- Svie ved vandladning
- Udflåd fra urinrør, ofte gulligt eller hvidligt
- Ømhed eller hævelse i testikler (sjældent)

Hos kvinder:

- Udflåd fra skeden
- Svie eller smerter ved vandladning
- Pletblødninger mellem menstruationer
- Smerter i underlivet

Ved analt eller oralt samleje kan infektionen give:

- Svie, smerter eller udflåd fra endetarmen



Lægen tager en prøve (podning) fra urinrør, skede, svælg og/eller endetarm, afhængig af, hvordan man har haft sex. Prøven sendes til laboratoriet og/eller mikroskoperes direkte. Bakterien kan påvises ved mikroskopi, pcr-test og dyrkning.

Gonorré behandles med antibiotika – ofte en injektion. Det er vigtigt, at behandlingen gives korrekt, da nogle stammer af bakterien er blevet resistente over for visse antibiotika.

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 070226

Efter behandlingen skal man møde til kontrolprøve efter ca. 1-2 uger for at sikre, at infektionen er kureret.

Du bør undgå seksuel kontakt, indtil du og din(e) partner(e) har fået bekræftet, at infektionen er væk.

Brug kondom ved seksuelt samvær fremover for at beskytte dig selv og dine partnere.

Alle seksuelle partnere inden for de seneste 2 måneder skal informeres og tilbydes test og behandling – også selvom de ikke har symptomer.

Ubehandlet gonorré kan føre til alvorlige komplikationer:

Hos kvinder:

- Underlivsbetændelse
- Nedsat fertilitet
- Øget risiko for graviditet uden for livmoderen

Hos mænd:

- Bitestikelbetændelse
- Fertilitetsproblemer

Hos begge:

- Smitterisiko ved seksuel kontakt
- Øget risiko for HIV-smitte

- Brug kondom ved nyt eller skiftende partnere
- Bliv testet regelmæssigt, hvis du har flere sexpartnere
- Informér partner(e) ved mistanke om smitte

- Kontakt læge, hvis du har symptomer, som beskrevet ovenfor, eller
- Hvis din partner er blevet diagnosticeret med gonorré, eller
- Hvis du har haft ubeskyttet sex og vil testes