

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 130226

Kaposi sarkom

Kaposi sarkom er en sjælden kræftform, som udgår fra celler i blod- og lymfekar. Sygdommen viser sig oftest som rødlige, violette eller brunlige pletter eller knuder i huden, men kan også påvirke slimhinder, lymfeknuder og indre organer.

Kaposi sarkom udvikler sig typisk langsomt, men sygdommens forløb afhænger af typen og af personens immunforsvar.

Årsag

Kaposi sarkom skyldes infektion med Humant herpesvirus 8 (HHV-8). Mange mennesker kan være smittet med virus uden at udvikle sygdom. Risikoen for at få Kaposi sarkom øges, hvis immunforsvaret er svækket.

Sygdommen ses især ved:

- Hiv-infektion (aids-relateret Kaposi sarkom)
- Behandling med immundæmpende medicin, fx efter organtransplantation
- Ældre mænd fra Middelhavsområdet eller Østeuropa (klassisk type)
- Visse områder i Afrika (endemisk type)

Symptomer

De mest almindelige symptomer er:

- Rødviolette eller brunlige pletter i huden
- Knuder eller hævelser, som ikke forsvinder
- Hævelse i benene (lymfødem)

Hvis sygdommen påvirker indre organer, kan der opstå:

- Hoste eller åndenød (lunger)
- Mavesmerter eller blødning fra mave-tarmkanalen
- Hævede lymfeknuder

Hudforandringerne gør som regel ikke ondt, men kan være kosmetisk generende.



Undersøgelse og diagnose

Diagnosen stilles ved en vævsprøve (biopsi) fra en hudforandring. Der kan desuden være behov for blodprøver og scanninger (fx CT-scanning) for at vurdere, om sygdommen har spredt sig.

Der tilbydes test for hiv, da behandlingen af denne infektion i så fald er vigtig for sygdomsforløbet.

Behandling

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Øernes Kaj 2, st.
DK-3700 Rønne
+45 56 95 86 00

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 130226

Behandlingen afhænger af typen af Kaposi sarkom, sygdommens udbredelse og immunforsvarets tilstand.

Ved hiv-relateret sygdom

Effektiv behandling med antiretroviral medicin mod HIV er afgørende og kan ofte få hudforandringerne til at svinde.

Lokal behandling

Ved få hudforandringer kan man anvende:

- Strålebehandling
- Kirurgisk fjernelse
- Lokal kemoterapi

Systemisk behandling

Hvis sygdommen er udbredt, kan kemoterapi eller anden medicinsk behandling være nødvendig.

Hos patienter, der får immundæmpende medicin, kan det i nogle tilfælde hjælpe at justere behandlingen.

Prognose

Prognosen varierer. Hos personer med velfungerende immunforsvar eller velbehandlet hiv er udsigterne ofte gode. Sygdommen kan dog være mere alvorlig ved svær immunsvækkelse eller udbredt organpåvirkning.