

Klamydia

- Ondt i halsen (sjældent)

Klamydia er en seksuelt overført infektion (SOI) forårsaget af bakterien *Chlamydia trachomatis*.

Infektionen smitter primært ved vaginalt, analt eller oralt samleje uden kondom. Den kan også i sjældne tilfælde overføres fra mor til barn ved fødslen.

Klamydia er den mest almindelige kønssygdom i Danmark, især blandt unge under 30 år.

Mange, både mænd og kvinder, får ingen symptomer.

Hvis der er symptomer, kan de være:

Hos kvinder:

- Svie ved vandladning
- Øget udflåd fra skeden
- Smerter eller trykken i underlivet
- Blødning mellem menstruationer eller efter samleje

Hos mænd:

- Svie ved vandladning
- Udflåd fra urinrøret (klart eller hvidligt)
- Smerte eller hævelse i testikler (sjældnere)

Ved analt eller oralt samleje kan der opstå:

- Smerte, svie eller udflåd fra endetarmen



Klamydia påvises ved en prøve fra urin, urinrør eller podning fra skede, livmoderhals, endetarm eller svælg – afhængig af, hvordan man har haft sex. Resultatet fås typisk inden for få dage.

Klamydia behandles effektivt med antibiotika i form af tabletter – som regel doxycyklin i 7 dage.

Det er vigtigt:

- At tage hele kuren som ordineret.
- At undgå seksuel kontakt under behandlingen og mindst 7 dage efter, behandlingen er startet.
- At informere og få testet ens seksuelle partner(e) – ellers risikerer man gensmitte.

Du kan have sex igen, når du og din partner er færdigbehandlet, og der er gået mindst 7 dage efter behandlingsstart. Brug kondom ved fremtidigt seksuelt

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 070226

samvær for at mindske risikoen for gentagen smitte.

Alle seksuelle partnere inden for de sidste 2 måneder skal informeres, testes og eventuelt behandles – også selvom de ikke har symptomer.

Ubehandlet klamydia kan give alvorlige komplikationer:

Hos kvinder:

- Betændelse i underlivet (underlivsbetændelse)
- Sammenvoksninger i æggelederne
- Nedsat fertilitet eller ufrivillig barnløshed
- Øget risiko for graviditet uden for livmoderen

Hos mænd:

- Betændelse i testiklerne (epididymitis)
- Smerter og nedsat fertilitet (sjældent)

Hos begge:

- Øget risiko for smitte med hiv