

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 060226

Lentigo maligna

Overfladisk modermærkekræft

Lentigo maligna er en tidlig form for modermærkekræft (malignt melanom), som udvikler sig i hudens øverste lag. Det betragtes som et *melanom in situ*, hvilket betyder, at de kræftforandrede celler endnu ikke er vokset ned i de dybere hudlag.

Lentigo maligna udvikler sig langsomt over flere år og ses oftest hos ældre personer i soludsatte områder af huden – især i ansigtet.

Den vigtigste årsag er mange års udsættelse for solens ultraviolette (UV) stråling. Derfor opstår tilstanden typisk på hudområder, som har været udsat for sol gennem livet, fx:

- Kinder
- Næse
- Tindinger
- Pande
- Hals

Risikoen øges ved:

- Lys hudtype
- Mange års solpåvirkning
- Tidligere solskoldninger
- Høj alder

Lentigo maligna viser sig som en flad, brunlig plet i huden, som langsomt vokser i størrelse. Den kan:

- Have ujævne eller utydelige kanter
- Have flere nuancer af brun eller sort
- Ændre sig gradvist over tid

Pletten kan ligne en almindelig aldersplet (leverplet), men adskiller sig ved at vokse, ændre farve eller få uregelmæssige kanter.



Hvis forandringen begynder at vokse ned i huden, kaldes det lentigo maligna melanom, som er en invasiv form for modermærkekræft.

Ved mistanke vil lægen undersøge huden, ofte med et dermatoskop (forstørrelsesinstrument). Diagnosen bekræftes ved at tage en vævsprøve (biopsi) eller ved at fjerne hele forandringen i lokalbedøvelse og sende den til mikroskopisk undersøgelse.

Behandling

Behandlingen er kirurgisk fjernelse af forandringen med en passende sikkerhedsmargin.

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 060226

Hvis operation ikke er mulig, kan andre behandlingsmuligheder i særlige tilfælde overvejes, fx lokal medicinsk behandling eller strålebehandling.

Forløb og prognose

Når lentigo maligna behandles i tide, er prognosen meget god, da forandringen kun sidder i det øverste hudlag.

Ubehandlet kan den over tid udvikle sig til invasivt melanom.
