

# Bornholms og Christiansøs Hudklinik

## Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 070226

### Lymfogranuloma venereum

Lymfogranuloma venereum (LGV) er en **seksuelt overført infektion**, som skyldes en særlig type bakterie (*Chlamydia trachomatis*, serotyper L1–L3). LGV er beslægtet med almindelig klamydia, men giver ofte **mere udtalte og alvorlige symptomer**, hvis den ikke behandles.

LGV smitter ved **seksuel kontakt**, herunder:

- Vaginalt samleje
- Analt samleje
- Oral sex (sjældnere)

Smitte sker ved kontakt med slimhinder eller sekret fra en smittet person. Brug af kondom reducerer risikoen for smitte betydeligt.

Symptomerne kan variere og afhænger af smittevejen. Nogle oplever kun milde symptomer i starten.

#### Tidlige symptomer

- Lille smertefri sår eller revne på kønsdele eller omkring endetarmen
- Ofte ubemærket og forsvinder af sig selv

#### Senere symptomer

- Hævede og ømme lymfeknuder i lysken

- Feber, utilpashed og træthed
- Smerter i endetarmen, slim- eller blodig afføring
- Afføringstrang og smerter ved toiletbesøg

Ubehandlet kan LGV føre til **kroniske smerter, arvævsdannelse og forsnævringer**, især i endetarmen.



Diagnosen stilles ved:

- **Podning** fra endetarm, sår eller urinrør
- Eventuelt **blodprøver**
- Specialundersøgelse for LGV-typer af klamydia

LGV behandles med **antibiotika**, oftest:

- **Doxycyklin i 21 dage**

Det er vigtigt at:

- Tage hele behandlingen som ordineret
- Undgå sex under behandlingen og indtil du er erklæret rask

# Bornholms og Christiansøs Hudklinik

## Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 070226

- Informere tidligere og nuværende seksualpartnere, så de kan blive testet og behandlet

Ved korrekt behandling helbreddes LGV fuldstændigt.

### Kontrol og opfølgning

Efter endt behandling anbefales ofte:

- **Kontroltest**
- Opfølgning på symptomer

Din læge vil informere dig om det videre forløb.

---

Alle seksualpartnere bør:

- Informeres
- Tilbydes test og eventuel behandling

Dette er vigtigt for at forhindre gensmitte og videre smitte.

---

Du kan reducere risikoen for LGV og andre seksuelt overførte infektioner ved at:

- Bruge **kondom** ved sex
- Blive testet regelmæssigt, hvis du har skiftende partnere
- Søge læge ved symptomer fra kønsdele eller endetarm