

Mollusker

Vandvorter

Molluskler kaldes også vandvorter og skyldes et virus, der kaldes poxvirus. Molluskler ses hyppigt hos børn, men voksne kan også blive smittet.

Børn kan smitte hinanden ved tæt kontakt i børneinstitutioner eller svømmehaller og lignende.

Hos voksne kan poxvirus smitte ved nærkontakt f.eks. seksuel kontakt.

Der går cirka 2 – 7 uger fra man er smittet til man får synlige molluskler på huden.

Molluskler er 2 – 5 mm store knopper på huden, der kan variere i farven fra at være lyse til hudfarvede. Antallet af molluskler kan variere. Ofte er der kun få molluskler men hos særligt udsatte patienter f.eks. børn med atopisk eksem, kan der være tendens til, at der kommer flere.

Hos patienter, der får medicin som svækker immunforsvaret, kan molluskler være større og mere udbredte. Hos de, der er seksuelt smittede, sidder molluskler ofte ved kønsbehåringen og på indersiden af lårene.

En hudlæge kan se om du har molluskler, da forandringerne er meget karakteristiske.

Ofte ser man mollusklerne an i nogle måneder, da de hyppigt forsvinder af sig selv.



Hvis mollusklerne skal behandles, er der flere muligheder:

- Frysning: Molluskler kan behandles med frysning med flydende kvælstof.
- Afskrabning: Man kan skrabe molluskler af med et specielt instrument (en skarpske).
- Canthacur: Molluskler kan behandles med Canthacur som er et blæredannende stof.

Det behandlede område holdes rent med vand og sæbe.

Hvis der kommer sårskorpe, der klør, kan det hjælpe at bruge en fed, uparfumeret fugtighedscreme.

Hold øje med at der ikke kommer betændelse i såret. Hvis såret er rødt, varmt, hævet og gør ondt skal du søge læge.