

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 040125

Pladecellekræft

Spinocellulært carcinom

Kutan pladecellekræft er en type hudkræft, der opstår i hudens øverste lag (epidermis). Den udvikler sig fra hudens pladeceller og er den næsthyppest form for hudkræft.

Sygdommen opstår oftest i hudområder, der gennem mange år har været udsat for sollys.

Den vigtigste årsag er **langvarig udsættelse for ultraviolet (UV) stråling** fra solen eller solarium.

Andre risikofaktorer:

- Lys hudtype
- Mange solskoldninger
- Høj alder
- Svækket immunforsvar
- Forstadier som aktiniske keratoser

Risikoen stiger med alderen.

Kutan pladecellekræft kan vise sig som:

- En fast knude i huden
- Et sår, der ikke heler
- En skællende eller skorpet forandring
- En fortykket, ru plet

Den kan være øm og nogle gange bløde.

Den ses hyppigst på:

- Ansigt
- Ører
- Læber
- Hovedbund
- Håndrygge



I de fleste tilfælde kan det helbredes.

Pladecellekræft kan vokse lokalt og ødelægge væv. I sjældne tilfælde kan den sprede sig til lymfeknuder eller andre organer, især hvis den ikke behandles i tide.

Tidlig behandling giver meget god prognose.

Lægen vil undersøge huden og ofte tage en lille vævsprøve (biopsi). Diagnosen bekræftes ved mikroskopisk undersøgelse.

Behandling

Behandlingen afhænger af størrelse og placering.

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 040125

Operation

Den mest almindelige behandling.
Kræftforandringen fjernes med en lille
sikkerhedsrand af rask hud.

Strålebehandling

Kan bruges, hvis operation ikke er mulig.

Efter behandling vil man ofte blive fulgt
med kontrolbesøg.

Hvad kan du selv gøre?

- Beskyt huden mod solen
 - Brug solcreme (SPF 30–50)
 - Undgå solarium
 - Brug hat og tøj i solen
- Hold øje med nye eller ændrede
hudforandringer
- Kontakt læge ved sår, der ikke
heler inden for 3–4 uger