

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 130226

Planocellulært carcinom in situ

Mb. Bowen

Behandlingen afhænger af størrelse, placering og patientens generelle helbred.

Mulige behandlingsformer:

Morbus Bowen er en tidlig form for hudkræft. Det er en forstadie til pladecellekræft (planocellulært karcinom), hvor kræftcellerne kun findes i det øverste hudlag (overhuden) og endnu ikke er vokset ned i de dybere lag. Mb. Bowen udvikler sig langsomt og kan behandles effektivt.

- **Operation**, hvor forandringen fjernes
- **Frysning (kryoterapi)**
- **Skrabning og brænding (curettage)**
- **Lokal kemoterapicreme (fx 5-fluoruracil)**
- **Immunstimulerende creme (fx imiquimod)**
- I visse tilfælde **lysbehandling (fotodynamisk terapi)**

Den hyppigste årsag er mange års påvirkning fra solens ultraviolette (UV) stråler.

Andre risikofaktorer kan være:

- Høj alder
- Lys hudtype
- Nedsat immunforsvar eller immunsuppressiv behandling
- Tidligere strålebehandling
- Infektion med visse typer HPV (især ved forandringer i underlivet)

Mb. Bowen viser sig typisk som:

- En rødlig, skællende plet eller plaque
- Velfrænsset område i huden
- Langsomt voksende
- Kan ligne eksem eller psoriasis

Forandringen kan være let kløende, men er ofte uden smerter. Den ses hyppigst på soludsatte områder som ansigt, hals, underarme og underben, men kan forekomme overalt på kroppen.

