

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 070226

Syfilis

Syfilis er en seksuelt overført infektion (SOI), som skyldes bakterien *Treponema pallidum*. Sygdommen smitter ved vaginalt, oralt eller analt samleje med en smittet person. Den kan også – i sjældne tilfælde – overføres fra mor til barn under graviditet eller fødsel.

Syfilis kan forløbe i flere stadier og give forskellige symptomer over tid. Uden behandling kan sygdommen blive kronisk og medføre alvorlige komplikationer.

Symptomerne varierer alt efter sygdomsstadiet, og mange mærker ingen symptomer, selvom de er smittede.

1. stadie (3 uger efter smitte):

- Et sår på kønsorganerne, i munden eller ved endetarmen.
- Såret er typisk hårdt, ikke smertefuldt og forsvinder af sig selv efter få uger.
- Hævede lymfeknuder i området.

2. stadie (uger til måneder senere):

- Udslæt på krop, hænder eller fødder.
- Feber, utilpashed, hovedpine, hævelse af lymfeknuder.
- Sår på slimhinderne i munden eller kønsorganerne.

Disse symptomer forsvinder ofte uden behandling, men bakterien bliver i kroppen.

Sene stadier (efter flere år uden behandling):

- Skader på hjerne, nerver, hjerte, blodkar, lever og knogler.
- Alvorlige symptomer som demenslignende tilstande, eller blindhed og døvhed.

Disse skader er irreversible, men yderligere forværring kan forhindres med behandling.



Diagnosen stilles ved en blodprøve, som kan påvise antistoffer mod syfilisbakterien. Ved sår kan man også tage en podning direkte fra såret.

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 070226

Tidlig diagnose og behandling forebygger disse problemer.

Syfilis behandles med antibiotika, som regel penicillin givet som injektion. Behandlingen er meget effektiv, især hvis sygdommen opdages tidligt.

Efter endt behandling kontrolleres blodprøverne efter nogle måneder for at sikre, at infektionen er forsvundet.

Ved penicillinallergi findes alternative antibiotika.

Du bør undgå seksuel kontakt, indtil lægen bekræfter, at infektionen er kureret, og eventuelle partnere er blevet behandlet. Det er vigtigt for at forhindre gensmitte og videre spredning.

Alle seksuelle partnere inden for de sidste 3 måneder (eller længere tilbage afhængig af sygdomsstadie) bør informeres, testes og eventuelt behandles – også selvom de ingen symptomer har.

Ubehandlet syfilis kan føre til alvorlige komplikationer:

- Skader på hjerte, nervesystem og organer
- Blindhed, lammelse, demenslignende tilstande
- Overførsel til foster under graviditet (med risiko for dødfødsel eller alvorlig sygdom hos barnet)

-
- Brug kondom ved nye eller skiftende sexpartnere
 - Bliv testet regelmæssigt, hvis du har flere partnere
 - Informér og bed partnere blive testet ved mistanke om smitte