

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 090226

Tetracyklin

Tetracyklin er et antibiotikum, som har været anvendt i mange år. Inden for dermatologi bruges tetracyklin ikke kun for sin antibakterielle effekt, men også fordi det har en **betændelseshæmmende (anti-inflammatorisk) virkning**.

Tetracyklin anvendes især til behandling af:

- **Akne**
- **Rosacea**
- **Perioral dermatitis**
- **Hidradenitis suppurativa** (i udvalgte tilfælde)
- Andre inflammatoriske hudsygdomme efter lægelig vurdering

Behandlingen sigter mod at dæmpe inflammation i huden og reducere bakterier, som kan bidrage til sygdommen.

Tetracyklin hæmmer væksten af visse bakterier og reducerer samtidig inflammation i huden. Effekten ses som regel efter **2–6 uger**, men ved nogle hudsygdomme kan der gå længere tid, før den fulde effekt opnås. Behandlingen gives ofte i **uger til måneder**.

- Tabletterne tages som regel **1–2 gange dagligt** efter lægens anvisning

- Tetracyklin skal tages **med et let måltid uden mælkeprodukter**
- Tabletterne sluges hele med et stort glas vand

Vigtigt:

- Undgå at tage tetracyklin sammen med **mælk, mejeriprodukter, kalktabletter, jern eller magnesium**, da dette nedsætter virkningen
- Læg dig ikke ned umiddelbart efter indtag, da det kan irritere spiserøret

De fleste tåler tetracyklin godt, men bivirkninger kan forekomme.

Almindelige bivirkninger

- Kvalme, mavesmerter eller diarré
- Svampeinfektion i mund eller skede

Andre bivirkninger

- **Øget følsomhed for sollys** (fotosensitivitet)
- Hududslæt

Sjældne, men alvorlige bivirkninger

- Kraftige mave-tarm-symptomer
- Allergiske reaktioner
- Påvirkning af leverfunktionen (sjældent)

Bornholms og Christiansøs Hudklinik

Patientinformation

Ansvarlig: William Troensegaard 090226

Tetracyclin kan gøre huden mere følsom over for sollys. Du bør derfor:

- Bruge **høj solbeskyttelse**
- Undgå stærk sol og solarium
- Bruge beskyttende tøj ved soleksponering

Tetracyclin må **ikke anvendes under graviditet** og anbefales heller ikke under amning, da det kan påvirke barnets tænder og knogleudvikling. Informér altid din læge, hvis du er gravid, ammer eller planlægger graviditet.

Oplys din læge om al anden medicin, du tager. Tetracyclin kan påvirkes af:

- Syreneutraliserende midler
- Kalk-, jern- og magnesiumtilskud
- Visse andre lægemidler