

Ulcus molle

Blød chancere

Ulcus molle – også kaldet chancroid eller blød chanker – er en sjælden, men smitsom seksuelt overført infektion (SOI), som skyldes bakterien *Haemophilus ducreyi*.

Sygdommen er hyppigst forekommende i tropiske og subtropiske lande, men ses sjældent i Danmark. Den kan dog opstå efter seksuel kontakt i udlandet eller med en partner, der er smittet.

Smitten overføres ved direkte seksuel kontakt (vaginalt, oralt eller analt samleje) med en person, der har sår eller væske på kønsorganerne.

Inkubationstiden – tiden fra smitte til symptomer – er typisk 3–10 dage.

Ulcus molle øger også risikoen for at blive smittet med hiv, fordi sårene gør huden mere modtagelig for virus.

De første symptomer er et lille sår eller knop på kønsorganerne, som hurtigt udvikler sig til et åbent, smertefuldt sår.

Typiske tegn er:

- Et eller flere små sår på kønsorganerne (penis, skamlæber, anus eller i sjældne tilfælde mund)
- Bløde, ømme kanter på sårene – modsat de hårde, smertefri sår ved syfilis
- Smertende hævelse af lymfeknuder i lysken, som kan

udvikle sig til bylder (såkaldte "buboner")

- Ømhed, svie og ubehag ved samleje eller vandladning
- Nogle får også let feber og almen sygdomsfølelse



Diagnosen stilles på baggrund af sygehistorie, rejseaktivitet, symptomer og udseende af sårene.

Lægen kan tage:

- Podning eller skrab fra såret, som undersøges for bakterien *Haemophilus ducreyi*

Særligt vigtigt er det at sikre, at såret ikke skyldes syfilis, da sygdommene kan ligne hinanden.

Ulcus molle behandles med antibiotika, som dræber bakterien. Sårene heler normalt inden for 1-3 uger efter påbegyndt behandling. Ved store bylder kan lægen vælge at tømme dem forsigtigt med en nål eller lille snit.